

## ÜBUNG 10

Ausgabedatum: 20. Dezember 2022

**Hausaufgabe 10.1** (Schranke an den Abstand zum globalen Minimierer) 5 Punkte

Es sei  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  eine eigentliche,  $\mu$ -stark konvexe Funktion.

(i) Zeigen Sie, dass falls  $x^*$  ein globaler Minimierer von  $f$  über  $\mathbb{R}^n$  ist, dann ist

$$\|x - x^*\|^2 \leq \frac{2}{\mu} |f(x) - f(x^*)|.$$

(ii) Geben Sie ein Gegenbeispiel an, das zeigt, dass **Punkt (i)** i. A. nicht gilt, wenn  $x^*$  kein globaler Minimierer von  $f$  ist.

**Hausaufgabe 10.2** (Beispiele von Projektionsaufgaben) 6 Punkte

(i) Bestimmen Sie eine explizite Darstellung der orthogonalen Projektion auf einen affinen Unterraum  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ .

(ii) Zeigen Sie, dass die Konvexität der Zielmenge  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  in der Projektionsaufgabe (**Beispiel 16.1**) entscheidend für die Wohldefiniertheit der Aufgabe ist. Geben Sie dazu eine nichtleere, kompakte und nichtkonvexe Zielmenge  $C$  sowie einen Punkt  $p \in \mathbb{R}^n$  an, bei dem die gesamte Menge  $C$  Lösung der Projektionsaufgabe (**16.1**) für den Punkt  $p$  ist.

**Hausaufgabe 10.3** (Dimension eines affinen Unterraums) 7 Punkte

Beweisen Sie **Lemma 16.7** aus dem Skript, also die folgenden Aussagen für einen affinen Unterraum  $A \subset \mathbb{R}^n$ .

- (i)  $A$  besitzt genau dann eine affine Basis  $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$  aus  $k + 1$  Elementen mit  $k \geq 0$ , wenn  $\dim A = k$  ist.
- (ii) Ist  $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$  eine affine Basis von  $A$ , dann lässt sich jedes Element von  $A$  auf eindeutige Art und Weise aus  $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$  affinkombinieren. Genauer hat jedes  $x \in A$  die Darstellung

$$x = \sum_{i=0}^k \alpha_i x_i$$

mit Koeffizienten  $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_k)^\top$ , die sich aus der eindeutigen Lösung des linearen Gleichungssystems

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ | & & | \\ x_0 & \cdots & x_k \\ | & & | \end{bmatrix}}_{=:B} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ | \\ x \\ | \end{pmatrix}}_{=:b} \quad (*)$$

ergeben. Die Matrix  $B \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (k+1)}$  hat Rang  $k+1$ . Daher ist  $B^\top B$  regulär, und  $(*)$  kann äquivalent als

$$B^\top B \alpha = B^\top b$$

geschrieben werden.

**Hausaufgabe 10.4** (Satz von Carathéodory)

6 Punkte

Beweisen Sie den Satz 16.13 von Carathéodory, also die folgende Aussage:

Es sei  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  eine beliebige Menge der Dimension  $k$  und  $x \in \text{conv}(M)$  eine Konvexkombination der Punkte  $x_0, \dots, x_m \in M$  mit  $m \geq 0$ . Dann ist  $x$  bereits eine Konvexkombination von höchstens  $k + 1$  dieser Punkte.

**Hinweis:** Nutzen Sie, dass die Punkte  $x_0, \dots, x_m \in M$  im Falle von  $m > k$  affin abhängig sind.

**Hausaufgabe 10.5** (Randlage von Maximierern konvexer Funktionen.)

3 Punkte

Es sei  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  konvex. Zeigen Sie: Wenn  $f$  den Wert

$$\sup_{x \in \text{dom } f} f(x)$$

in einem Punkt in  $\text{rel int}(\text{dom } f)$  annimmt, dann ist  $f$  konstant auf  $\text{dom } f$ .

Es ist keine Abgabe Ihrer Lösungen zu diesem Übungsblatt vorgesehen.