

Klausurrelevanz inkl. Woche 13

Übungsblatt 13 nicht zulassungsrelevant, ^{keine} Abgabe
letzte Vorlesung: Di, 16.07.2024 (Woche 14/1)

Lineare Algebra II

Woche 12

Erinnerung:

Alle Vektorräume in §34 sind reell ($K = \mathbb{R}$)

01.07.2024 und 02.07.2024

Euklidischer Raum := \mathbb{R} -Vektorraum mit IP

Nachtrag: positive Definitheit impliziert Invertierbarkeit

Lemma 34.6 (Version für Matrizen)

Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ für $n \in \mathbb{N}_0$ eine (nicht notwendig symmetrische) positiv definite Matrix. $x^T A x > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

Dann ist A invertierbar, und die inverse Matrix A^{-1} ist wieder positiv definit.

Beweis. Wenn A nicht invertierbar ist,

dann ist A nicht injektiv, also ex. $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ mit $Ax = 0$.

$\Rightarrow x^T A x = 0$, also ist A nicht positiv definit.

$$\begin{aligned} \xi^T A^{-1} \xi &= (Ax)^T A^{-1} (Ax) = x^T \underbrace{A^T A^{-1} A}_{= I} x \\ &= x^T A^T x = x^T A x > 0 \end{aligned}$$

$\xi \neq 0$ \uparrow $\in \mathbb{R}^n$ $x := A^{-1} \xi \neq 0$ $\xi = Ax \neq 0$

Homomorphismen Euklidischer Räume

vgl.: Homomorphismen von Vektorräumen heißen lineare Abbildungen.

Definition 34.20

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei Euklidische Räume.

Eine Abbildung $f: V \rightarrow W$ heißt orthogonal oder eine (lineare)

Isometrie bzgl. (γ_1, γ_2) , wenn f ein Homomorphismus der quadratischen Räume $(V, \gamma_1) \rightarrow (W, \gamma_2)$ ist, wenn also gilt:
(Euklidischen)

- f ist linear
- $\gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v) \quad \forall u, v \in V$
(bedeutet: winkelerhaltend)

kurz: (γ_1, γ_2) -orthogonal

Satz 34.21

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei Euklidische Räume und $f \in \text{Hom}(V, W)$. Dann sind äquivalent:

- 1 f ist (γ_1, γ_2) -orthogonal.
- 2 $\|f(v)\|_{\gamma_2} = \|v\|_{\gamma_1}$ für alle $v \in V$. *Längentreu*
- 3 $\|f(v_1) - f(v_2)\|_{\gamma_2} = \|v_1 - v_2\|_{\gamma_1}$ für alle $v_1, v_2 \in V$. *Abstandstreue (isometrisch)*
- 4 Ist $(v_i)_{i \in I}$ eine orthonormale Familie in (V, γ_1) , dann ist auch $(f(v_i))_{i \in I}$ eine orthonormale Familie in (W, γ_2) . *Orthonormalitätserhaltung*
- 5 Ist v ein Einheitsvektor in (V, γ_1) , dann ist $f(v)$ ein Einheitsvektor in (W, γ_2) .

Orthogonale Abbildungen sind injektiv

Lemma 34.22

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei Euklidische Räume.

- 1 Ist $f \in \text{Hom}(V, W)$ eine (γ_1, γ_2) -orthogonale Abbildung, dann ist f injektiv.

Also notwendig $\dim(V) \leq \dim(W)$

A

- 2 Gilt zusätzlich $\dim(V) = \dim(W) = n \in \mathbb{N}_0$, dann ist f bijektiv und f^{-1} ebenfalls eine bijektive orthogonale Abbildung.

Beweis. Übung


Komposition orthogonaler Abbildungen

Lemma 34.23

Es seien (U, γ_1) und $(V, \gamma_2), (W, \gamma_3)$ Euklidische Räume. Sind

- $g: U \rightarrow V$ eine (γ_1, γ_2) -orthogonale Abbildung und
- $f: V \rightarrow W$ eine (γ_2, γ_3) -orthogonale Abbildung,

dann ist $f \circ g: U \rightarrow W$ eine (γ_1, γ_3) -orthogonale Abbildung.



Bijektive Isometrie in den Koordinatenraum

Lemma 34.24

Es sei (V, γ) ein Euklidischer Raum mit $\dim(V) = n \in \mathbb{N}_0$. Weiter sei B_V eine Basis von V und $M := M_{B_V}^{B_V}(\gamma)$ die Darstellungsmatrix von γ .

Dann ist die Abbildung

$$\Phi_{B_V}: (\mathbb{R}^n, \gamma_M) \rightarrow (V, \gamma) \quad \Phi_{B_V}(x) = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{v_i}_{\in B_V}$$

eine bijektive Isometrie. Das heißt, für alle $u, v \in V$ gilt

$$x^T \cdot y = \gamma(u, v)$$

$$u = \Phi_{B_V}(x), \quad v = \Phi_{B_V}(y)$$

Orthogonalität in Darstellungsmatrizen: Homomorphismen

$$\dim(V) = m$$

$$\dim(W) = n$$

Lemma 34.25

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei endlich-dimensionale Euklidische Räume mit Basen B_V bzw. B_W . Weiter seien $f \in \text{Hom}(V, W)$ und

$$\bullet M_1 := M_{B_V^*}^{B_V}(\gamma_1) \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

$$\bullet A = M_{B_W}^{B_V}(f) \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

$$\bullet M_2 := M_{B_W^*}^{B_W}(\gamma_2) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$(T^{-1} A^T S^T)(S^T M_2 S^{-1})(S A T^{-1}) = T^{-1} M_1 T$$

Dann sind äquivalent:

① f ist (γ_1, γ_2) -orthogonal.

② Die Darstellungsmatrix A erfüllt $A^T M_2 A = M_1$.

Beweis. $u = \Phi_{B_V}(x)$, $v = \Phi_{B_V}(y)$

$$\gamma_1(u, v) = x^T M_1 y$$

$$\gamma_2(f(u), f(v)) = [Ax]^T M_2 [Ay] = x^T A^T M_2 A y$$

Orthogonalität in Darstellungsmatrizen: Endomorphismen

Folgerung 34.26

Es sei (V, γ) ein endlich-dimensionaler Euklidischer Raum mit Basis B_V . Weiter seien $f \in \text{End}(V)$ und

- $M := \mathcal{M}_{B_V^*}^{B_V}(\gamma) \in \mathbb{R}^n$
- $A = \mathcal{M}_{B_V}^{B_V}(f) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Dann sind äquivalent:

- 1 f ist γ -orthogonal.
- 2 Die Darstellungsmatrix A erfüllt $A^T M A = M$.

Literatur: Spezialfall $M = I$ (d.h. B_V ist ONB)

$$\begin{aligned} A^T I A &= I \\ \cong \underbrace{\text{End}(V^*)} & \Big| \underbrace{\text{End}(V)} \\ & \cong \text{Hom}(V, V^*) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \nearrow \\ \text{Hom} \\ (V, V^*) \end{array}$$

Definition 34.27

- ① Es seien $m, n \in \mathbb{N}_0$, $M_1 \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und $M_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv definit.

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ heißt **(M_1, M_2) -orthogonal** im Fall

$$A^T M_2 A = M_1$$


A handwritten equation $A^T M_2 A = M_1$ where each term is enclosed in a hand-drawn box. The boxes are arranged to show the matrix multiplication structure.

- ② Es sei $n \in \mathbb{N}_0$ und $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv definit.

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^n$ heißt **M -orthogonal** im Fall

$$A^T M A = M$$


A handwritten equation $A^T M A = M$ where each term is enclosed in a hand-drawn box. The boxes are arranged to show the matrix multiplication structure.

Eigenwerte orthogonaler Endomorphismen

Lemma 34.29

Es sei (V, γ) ein Euklidischer Raum.

Ist $f \in \text{End}(V)$ γ -orthogonal, dann gilt $\Lambda(f) \subseteq \{\pm 1\}$.

Beweis. (λ, v) Eigenpaar von f

$$\underbrace{\|v\|}_{\neq 0} = \|f(v)\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \underbrace{\|v\|}_{\neq 0} \Rightarrow |\lambda| = 1.$$

Orthogonale Endomorphismen bilden eine Gruppe

Lemma 34.30

endlich-dimensionaler

Es sei (V, γ) ein Euklidischer Raum. Dann gilt:

- 1 Die γ -orthogonalen Endomorphismen von (V, γ) bilden eine Gruppe bzgl. der Komposition, genannt die **orthogonale Gruppe** des Euklidischen Raumes (V, γ) :

$$O(V, \gamma) := \{f \in \text{End}(V) \mid f \text{ ist } \gamma\text{-orthogonal}\}.$$

- 2 Ist V endlich-dimensional, dann bilden die γ -orthogonalen Endomorphismen $f \in O(V, \gamma)$ mit $\det(f) = 1$ einen Normalteiler von $O(V, \gamma)$, genannt die **spezielle orthogonale Gruppe** des Euklidischen Raumes (V, γ) :

$$SO(V, \gamma) := \{f \in O(V, \gamma) \mid \det(f) = 1\}.$$

von FP unabhängig

Beweis. Übung

Orthogonale (Darstellungs)matrizen bilden eine Gruppe

Folgerung 34.31 $\hat{=}$ Innenprodukt auf \mathbb{R}^n

Es sei $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv definit. Dann gilt:

- 1 Die M -orthogonalen Matrizen in $\mathbb{R}^{n \times n}$ bilden eine Gruppe bzgl. der Matrix-Multiplikation, genannt die **orthogonale Gruppe** des Euklidischen Raumes (\mathbb{R}^n, γ_M) :

$$O(\mathbb{R}^n, \gamma_M) := \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ ist } M\text{-orthogonal}\}.$$

- 2 Die M -orthogonalen Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $\det(A) = 1$ bilden einen Normalteiler von $O(\mathbb{R}^n, \gamma_M)$, genannt die **spezielle orthogonale Gruppe** des Euklidischen Raumes (\mathbb{R}^n, γ_M) :

$$SO(\mathbb{R}^n, \gamma_M) := \{A \in O(\mathbb{R}^n, \gamma_M) \mid \det(A) = 1\}.$$

Beispiel 34.33

- 1 Die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

ist I -orthogonal, denn:

$$A^T I A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

A ist aber nicht M -orthogonal bzgl. der Innenproduktmatrix

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ denn:}$$

$$A^T M A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \neq M$$

Orthogonale Endomorphismen und Matrizen

- 2 Die Drehabbildung, dargestellt durch

$$A = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

bzgl. der Standardbasis, ist I -orthogonal, denn:

$$\begin{aligned} A^T I A &= \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 + s^2 & 0 \\ 0 & s^2 + c^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

$$\det(A) = c^2 + s^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad A \in SO(\mathbb{R}^2, \gamma_I)$$

Orthogonale Endomorphismen und Matrizen

- 3 Die Spiegelungsabbildung, dargestellt durch

$$A = \begin{bmatrix} \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) \\ \sin(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$



bzgl. der Standardbasis, ist \mathbb{I} -orthogonal, denn:

$$A^T \mathbb{I} A = \begin{bmatrix} c & s \\ s & -c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ s & -c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbb{I}$$

$$\det(A) = -c^2 - s^2 = -1$$

$$A \in O(\mathbb{R}^2, \delta_{\mathbb{I}}) \setminus SO(\mathbb{R}^2, \delta_{\mathbb{I}})$$

Motivation

- Zwischen einem Vektorraum V und seinem Dualraum V^* gibt es auch bei endlicher Dimension keinen *kanonischen* Isomorphismus.
- Wenn wir jedoch ein Innenprodukt in V gewählt haben, dann induziert dieses eine bevorzugte Wahl eines solchen Isomorphismus in $\Gamma \in \text{Hom}(V, V^*)$.
- Γ ist mit den Innenprodukten γ in V und γ^{-1} in V^* kompatibel ist, also eine lineare Isometrie.
- Dieser Isomorphismus wird der **Riesz-Isomorphismus** des Euklidischen Raumes (V, γ) genannt.

Darstellungssatz von Riesz (Riesz-Fréchet)

Satz 34.34

Es sei (V, γ) ein endlich-dimensionaler Euklidischer Raum.

Dann ist die Abbildung $\Gamma: V \ni v \mapsto \gamma(\cdot, v) \in V^*$ ein Isomorphismus.

Wird V^* mit dem Innenprodukt γ^{-1} ausgestattet, dann ist

$\Gamma: (V, \gamma) \rightarrow (V^*, \gamma^{-1})$ eine bijektive Isometrie. Es gilt

(γ, γ^{-1}) -orthogonal

$$\gamma(u, v) = \underbrace{\langle \Gamma(v), u \rangle}_{\in V^*} = \underbrace{\langle \Gamma(u), v \rangle}_{\in V} = \gamma^{-1}(\Gamma(u), \Gamma(v))$$

Jedes Element $\xi \in V^*$ kann ^{eindeutig} dargestellt werden in der Form $\langle \xi, u \rangle = \gamma(v, \cdot)$ mit $v \in V$.

Rieszscher Darstellungssatz für (\mathbb{R}^n, γ_M)

Folgerung 34.36

Es sei $n \in \mathbb{N}_0$ und $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv definit.

Dann ist die Abbildung

$$\Gamma: \mathbb{R}^n \ni x \mapsto Mx \in (\mathbb{R}^n)^*$$

eine bijektive Isometrie der Euklidischen Räume (\mathbb{R}^n, γ_M) und $((\mathbb{R}^n)^*, \gamma_{M^{-1}})$.

Es gilt

$$\begin{array}{ccccccc} y^T Mx & = & y^T (Mx) & = & \underbrace{(My)^T}_x & = & \underbrace{(y^T M)}_{M^{-1}} \underbrace{(Mx)}_{(Mx)^*} \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \mathbb{R}^n & & \mathbb{R}^n & & & & \end{array}$$

$= \langle Mx, y \rangle = \langle My, x \rangle \in (\mathbb{R}^n)^* \in (\mathbb{R}^n)^*$

- Multipl. mit M : $\mathbb{R}^n \rightarrow (\mathbb{R}^n)^*$
- " " : $M^{-1} : (\mathbb{R}^n)^* \rightarrow \mathbb{R}^n$

Orthogonalität dualer Homomorphismen

Satz 34.37

$$f^* \in \text{Hom}(W^*, V^*)$$

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei endlich-dimensionale Euklidische Räume **derselben Dimension** und $f \in \text{Hom}(V, W)$. Dann sind äquivalent:

① f ist (γ_1, γ_2) -orthogonal.

② f^* ist $(\gamma_2^{-1}, \gamma_1^{-1})$ -orthogonal.

$$\square \square \square = \square$$

mögl. Konst.
für Orth.
von f

① heißt: A invertierbar & $A^T M_2 A = M_1$

② heißt: A^T invertierbar & $A M_1^{-1} A^T = M_2^{-1}$

$\Downarrow \Leftrightarrow$

$\dim(V) = \dim(W)$ ist wesentlich!

Für $\dim(V) \neq \dim(W)$ ist mind. eine von
①, ② falsch.

Folgerung 34.38

Es sei (V, γ) ein endlich-dimensionaler Euklidischer Raum und $f \in \text{End}(V)$. Dann sind äquivalent:

- 1 f ist γ -orthogonal.
- 2 f^* ist γ^{-1} -orthogonal.

Adjungierter Homomorphismus

Definition 34.39

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei Euklidische Räume. Weiter sei $f \in \text{Hom}(V, W)$ eine lineare Abbildung. Dann heißt

$$f^\circ := \Gamma_{V \rightarrow V^*}^{-1} \circ f^* \circ \Gamma_{W \rightarrow W^*}: W \rightarrow V$$

der zu f (γ_1, γ_2) -adjungierte Homomorphismus.

oder (γ_1, γ_2) -adjungierte Abb.

$$\begin{array}{ccc} (V, \gamma_1) & \xleftarrow{f^\circ} & (W, \gamma_2) \\ \Gamma_{V \rightarrow V^*} \downarrow & & \downarrow \Gamma_{W \rightarrow W^*} \\ (V^*, \gamma_1^{-1}) & \xleftarrow{f^*} & (W^*, \gamma_2^{-1}) \end{array}$$

$$\gamma_2(w, g(v)) = \gamma_1(f^\circ(w), v)$$

Vergleich dualer und adjungierter Homomorphismen

Es sei $f \in \text{Hom}(V, W)$.

dualer Homomorphismus

- $f^* \in \text{Hom}(W^*, V^*)$
- keine Abhängigkeit von Innenprodukten

$$\langle w^*, f(v) \rangle_{W^*, W} = \langle f^*(w^*), v \rangle_{V^*, V}$$

adjungierter Homomorphismus

- $f^\circ \in \text{Hom}(W, V)$
- erfordert Innenprodukte in V und W

$$\gamma_2(w, f(v)) = \gamma_1(f^\circ(w), v)$$

Darstellungsmatrizen adjungierter Homomorphismen

$$\dim(V) = m \quad \dim(W) = n$$

Satz 34.41

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) zwei endlich-dimensionale Euklidische Räume mit Basen B_V bzw. B_W . Weiter seien $f \in \text{Hom}(V, W)$ und

- $M_1 := \mathcal{M}_{B_V^*}^{B_V}(\gamma_1) \in \mathbb{R}^{m \times m}$
- $M_2 := \mathcal{M}_{B_W^*}^{B_W}(\gamma_2) \in \mathbb{R}^{n \times n}$
- $A = \mathcal{M}_{B_W}^{B_V}(f) \in \mathbb{R}^{n \times m}$

Dann gilt für die Darstellungsmatrix von $f^\circ \in \text{Hom}(W, V)$

$$A^\circ := \mathcal{M}_{B_V}^{B_W}(f^\circ) = M_1^{-1} A^T M_2$$

$$f^\circ = (\tau_{V \rightarrow V^*})^{-1} \circ f^* \circ \tau_{W \rightarrow W^*}$$

Biadjungierte Abbildung

Lemma 34.42

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) endlich-dimensionale Euklidische Räume.

Dann ist die (γ_1, γ_2) -biadjungierte Abbildung $f^{\circ\circ} := (f^\circ)^\circ$ identisch zu f , unabhängig von den Innenprodukten γ_1 und γ_2 .

(β_2, β_1) -adj. Abb.
der (β_1, β_2) -adj. Abs.
von f

Nochmal vier fundamentale Unterräume $\text{Kern}(f)$ und $\text{Bild}(f)$

Es seien (V, γ_1) und (W, γ_2) endlich-dimensionale Euklidische Räume und $f \in \text{Hom}(V, W)$.

Satz 21.36

$$\text{Bild}(f^*) = \text{Kern}(f)^\perp \quad \text{in } V^*$$

$$\text{Kern}(f^*) = \text{Bild}(f)^\perp \quad \text{in } W^*$$

$$\text{Bild}(f) = {}^\perp\text{Kern}(f^*) \quad \text{in } W$$

$$\text{Kern}(f) = {}^\perp\text{Bild}(f^*) \quad \text{in } V.$$

Satz 34.43

$$\text{Bild}(f^\circ) = \text{Kern}(f)^\perp \cap \gamma_1 \quad \text{in } V$$

$$\text{Kern}(f^\circ) = \text{Bild}(f)^\perp \cap \gamma_2 \quad \text{in } W$$

$$\text{Bild}(f) = \text{Kern}(f^\circ)^\perp \cap \gamma_2 \quad \text{in } W$$

$$\text{Kern}(f) = \text{Bild}(f^\circ)^\perp \cap \gamma_1 \quad \text{in } V.$$

Endomorphismen induzieren orthogonale direkte Summen

Folgerung 34.44

Es sei (V, γ) ein endlich-dimensionaler Euklidischer Raum.

Weiter sei $f \in \text{End}(V)$ mit γ -adjungierter Abbildung $f^\circ \in \text{End}(V)$.

Dann gilt:

$$V = \text{Kern}(f) \oplus \text{Bild}(f^\circ)$$

$$V = \text{Kern}(f^\circ) \oplus \text{Bild}(f)$$

Beweis:
$$\begin{aligned} V &= \text{Kern}(f) \oplus \text{Kern}(f)^\perp \\ &= \text{Kern}(f) \oplus \text{Bild}(f^\circ) \end{aligned}$$

und
$$\begin{aligned} V &= \text{Bild}(f) \oplus \text{Bild}(f)^\perp \\ &= \text{Bild}(f) \oplus \text{Kern}(f^\circ) \end{aligned}$$