

Lineare Algebra II

Woche 14

16.07.2024

Motivation: Rang-Normalform vs. Singulärwertzerlegung

$$A \in K^{n \times m}$$

Vektorräume K^n und K^m

Rang-Normalform

$$S A T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & \vdots & & \vdots \\ & & & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

mit S, T invertierbar
(Äquivalenztransformation)

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Innenprodukträume \mathbb{R}^n und \mathbb{R}^m

Singulärwertzerlegung

$$U^{-1} A V = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & \sigma_r & \vdots & & \vdots \\ & & & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

mit U, V orthonormale Spalten
(orthogonale Äquivalenztransf.)

Satz 36.1

Es seien $(\mathbb{R}^m, \gamma_{M_1})$ und $(\mathbb{R}^n, \gamma_{M_2})$ zwei Euklidische Räume.
Weiter sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit $\text{Rang}(A) = r$.

① Dann existieren

- eine Matrix $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ mit M_1 -orthonormalen Spalten
- eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit M_2 -orthonormalen Spalten
- eine Diagonalmatrix $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit nicht-negativen Einträgen

$$\Sigma = \left[\begin{array}{c|c} \sigma_1 & \\ & \vdots \\ & \sigma_n \\ \hline & 0 \end{array} \right] \quad \text{bzw.} \quad \Sigma = \left[\begin{array}{c} \sigma_1 \\ \vdots \\ \sigma_m \\ \hline 0 \end{array} \right]$$

mit $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ und $\sigma_{r+1} = \dots = \sigma_{\min\{m,n\}} = 0$ und

$$A = U \Sigma V^{-1}$$

Satz 36.1

Es seien $(\mathbb{R}^m, \gamma_{M_1})$ und $(\mathbb{R}^n, \gamma_{M_2})$ zwei Euklidische Räume.

Weiter sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit $\text{Rang}(A) = r$.

- 1 $A = U \Sigma V^{-1} \Leftrightarrow A V = U \Sigma \Leftrightarrow U^{-1} A V = \Sigma$
- 2 Die Zahlen $\sigma_1, \dots, \sigma_{\min\{m,n\}}$ sind die Wurzeln der größten Eigenwerte des M_1 -selbstadjungierten Endomorphismus $A^\circ A$.
- 3 Die Spalten von V bilden eine M_1 -orthonormale Basis aus Eigenvektoren des M_1 -selbstadjungierten Endomorphismus $A^\circ A$.
- 4


Definition 36.2

Es seien $(\mathbb{R}^m, \gamma_{M_1})$ und $(\mathbb{R}^n, \gamma_{M_2})$ zwei Euklidische Räume.

Weiter sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

- 1 Eine Zerlegung $A = U \Sigma V^{-1}$ wie angegeben heißt eine (M_1, M_2) -**Singulärwertzerlegung** von A .
- 2 Die Diagonaleinträge $\sigma_1, \dots, \sigma_{\min\{m,n\}} \geq 0$ der Matrix Σ heißen die (M_1, M_2) -**Singulärwerte** von A .
- 3 Die Eigenvektoren von $A^\circ A$ zum Eigenwert σ_j^2 heißen die (M_1, M_2) -**Rechts-Singulärvektoren** zum (M_1, M_2) -Singulärwert σ_j .
- 4 Die Eigenvektoren von $A A^\circ$ zum Eigenwert σ_j^2 heißen die (M_1, M_2) -**Links-Singulärvektoren** zum (M_1, M_2) -Singulärwert σ_j .
- 5 Jedes Tripel (σ_j, u, v) heißt ein (M_1, M_2) -**singuläres Tripel**.

Illustration der Singulärwertzerlegung



Singulärwertzerlegung der transponierten Matrix

$$A = U \Sigma V^{-1}$$

- Spalten von V sind M_1 -orthonormal
- Spalten von U sind M_2 -orthonormal

$$A^T = V^{-T} \Sigma^T U^T$$

- Spalten von U^{-T} sind M_2^{-1} -orthonormal
- Spalten von V^{-T} sind M_1^{-1} -orthonormal

Singulärwertzerlegung der inversen Matrix

$$A = U \Sigma V^{-1}$$

- Spalten von V sind M_1 -orthonormal
- Spalten von U sind M_2 -orthonormal

$$A^{-1} = V \Sigma^{-1} U^{-1}$$

- Spalten von U sind M_2 -orthonormal
- Spalten von V sind M_1 -orthonormal

Zusammenhang Singulärwert- und Spektralzerlegung

Satz 36.7

Es sei (\mathbb{R}^n, γ_M) ein Euklidischer Raum.

Weiter sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine M -selbstadjungierte Matrix.

Dann gilt folgender Zusammenhang:

M -Singulärwertzerlegung

$$A V = U \Sigma$$

M -Spektralzerlegung

$$A V = V \Lambda$$

(M_1, M_2) -Spektralnorm eines Homomorphismus

Definition 36.8 (Version für Matrizen)

Es seien $(\mathbb{R}^m, \gamma_{M_1})$ und $(\mathbb{R}^n, \gamma_{M_2})$ zwei Euklidische Räume.
Weiter sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

Dann heißt

$$\|A\|_{(\mathbb{R}^m, M_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, M_2)} := \max\{\|Ax\|_{M_2} \mid x \in S(\mathbb{R}^m, M_1)\}$$

die (M_1, M_2) -Spektralnorm von A .

(M_1, M_2) -Spektralnorm eines Homomorphismus

Satz 36.9

Es seien $(\mathbb{R}^m, \gamma_{M_1})$ und $(\mathbb{R}^n, \gamma_{M_2})$ zwei Euklidische Räume.

Weiter sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

Ist $A = U \Sigma V^{-1}$ eine (M_1, M_2) -Singulärwertzerlegung von A , dann gilt

$$\|A\|_{(\mathbb{R}^m, M_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, M_2)} = \sigma_1.$$

Singulärwertzerlegung in unitären Räumen

Satz 36.11

Es seien $(\mathbb{C}^m, \gamma_{M_1})$ und $(\mathbb{C}^n, \gamma_{M_2})$ zwei unitäre Räume.

Weiter sei $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ mit $\text{Rang}(A) = r$.

Dann existieren

- eine Matrix $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ mit M_1 -orthonormalen Spalten
- eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit M_2 -orthonormalen Spalten
- eine Diagonalmatrix $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit nicht-negativen Einträgen mit $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ und $\sigma_{r+1} = \dots = \sigma_{\min\{m,n\}} = 0$ und

$$A = U \Sigma V^{-1} \quad \Leftrightarrow \quad A V = U \Sigma \quad \Leftrightarrow \quad U^{-1} A V = \Sigma$$

Unendlich-dimensionale Optimierung



Grundlagen der Optimierung

Nichtlineare Optimierung